

【日本脳炎ワクチンの接種に関する Q&A】

Q1 標準的な接種量はどんな量ですか

A1 6ヶ月～3歳未満は0.25ml、3歳以上は0.5ml

Q2 どんな副反応がいつまで続きますか

A2 副作用としては、注射部位が赤くなったり、腫れたり、痛みが出たりすることが挙げられます。発熱や不機嫌などの全身の副作用もあります。発熱は1期初回で約3%、1期追加で約8%です。

接種後3日後まで見られます。

Q3 接種後日が続っていますが、今から何か心配な症状が出てくることがありますか

A3 接種後時間がたってからの副反応はありません

Q4 注射液を多く打ったらどうなりますか

A4 局所反応に頻度は高くなる傾向にあるが、健康被害の報告はありません

Q5 過量接種は効果がありますか

A5 効果は通常接種量の場合と変わりありません

Q6 母子手帳を見たら、3歳未満で接種していました、どうしたらいいですか

A6 接種を受けた医療機関にご確認ください

Q7 3歳未満で接種をされていて、母子手帳に量が書いてないのですが

A7 接種を受けた医療機関にご確認ください

Q8 2歳未満で初回接種の1回目を受けてしまいました。2回目はどうしたらいいですか
(3歳までに1年以上ある)

A8 3歳以降に接種してください